

病人須知 - 局部麻醉劑

Lidocaine + Prilocaine 乳膏



什麼是 Lidocaine + Prilocaine 乳膏？

Lidocaine + Prilocaine 乳膏含有 2.5% 的利多卡因 (Lidocaine) 及 2.5% 的丙胺卡因 (Prilocaine)。它屬於局部麻醉藥，用於在需要注射藥物、抽取血液樣本或在靜脈插入導管等醫療程序前麻痺皮膚。它有助於減輕疼痛或不適，並讓您的孩子保持冷靜，以確保醫療程序順利進行。

應使用多少份量的 Lidocaine + Prilocaine 乳膏？

醫生或護士會告知您需要塗抹多少乳膏。

Lidocaine + Prilocaine 乳膏應塗抹於沒有受損的皮膚。



如何使用 Lidocaine + Prilocaine 乳膏？




請在醫療程序開始前預留足夠的時間進行塗抹，以確保藥物有足夠時間發揮作用。

1. 將所需份量的乳膏塗抹於預定注射部位的中央。請勿揉擦或抹開乳膏。
2. 取出一片密封敷料並覆蓋乳膏。
3. 仔細黏好敷料邊緣，以防止滲漏。
4. 讓乳膏留在皮膚上 60 分鐘，或按照醫生或護士建議的時間。
5. 在醫療程序開始前才撕掉敷料。
6. 用紙巾抹除剩餘的乳膏。



① 將所需份量的乳膏塗抹於預定注射部位的中央。請勿揉擦或抹開乳膏。



② 取出一片密封敷料並覆蓋乳膏。



③ 仔細黏好敷料邊緣，以防止滲漏。



④ 讓乳膏留在皮膚上 60 分鐘，或按照醫生或護士建議的時間。



⑤ 在醫程序開始前才撕掉敷料。



⑥ 用紙巾抹除剩餘的乳膏。

病人須知 - 局部麻醉劑

Lidocaine + Prilocaine 乳膏



Lidocaine + Prilocaine 乳膏有哪些安全注意事項？



- 如果您的孩子有任何藥物過敏、葡萄糖-6-磷酸去氫酶缺乏症 (G6PD，俗稱蠶豆症)、先天性或特發性高鐵血紅蛋白血症、皮膚問題（例如異位性皮炎/濕疹），或目前正服用任何其他藥物，請告知醫生或護士。
- 塗抹前請確保皮膚清潔及乾爽。
- 使用前請檢查有效日期。切勿使用過期藥物。
- 如果醫療程序有所延遲，乳膏在達到下列最長敷藥時間後必須清除：
 - 1 歲或以下：最長 1 小時
 - 1 歲以上：最長 5 小時
- 切勿將乳膏塗抹於開放性傷口、破損皮膚、黏膜、口腔、眼睛及其周邊、以及避免任何可能滲入中耳的情況。

Lidocaine + Prilocaine 乳膏何時開始發揮作用？

- 塗抹乳膏 1 小時後，受藥皮膚區域應會感到麻痺。
- 移除乳膏後，皮膚會維持麻痺狀態約 1 至 2 小時。

如果忘記塗抹 Lidocaine + Prilocaine 乳膏怎麼辦？

如果您忘記塗抹或太遲塗抹乳膏，請告知醫生或護士。他們可能會決定推遲醫療程序。請勿自行塗抹額外的藥量。



Lidocaine + Prilocaine 乳膏有哪些可能的副作用？



塗抹部位可能會出現輕微且短暫的局部反應：

- 暫時性的蒼白、發紅或腫脹。
- 輕微的灼熱感、溫熱感或瘙癢。

罕見但嚴重的副作用（如發生以下情況，請立即移除乳膏並告知醫生或護士）：

- 持久或嚴重的皮膚反應，如紫斑或瘀點。
- 過敏反應，如皮疹、感到暈眩、呼吸困難、面部腫脹。
- 高鐵血紅蛋白血症的徵狀，如皮膚、嘴唇及指甲呈青紫色。

如何儲存 Lidocaine + Prilocaine 乳膏？

- 放置在兒童接觸不到的地方。
- 儲存於 30°C 以下的室溫環境，切勿冷藏。
- 僅供一次性使用。請丟棄未使用的剩餘部分。

如有任何疑問，請諮詢你的醫生、藥劑師及護士。

